

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アレギサール鼻炎
2	成分・分量	成分(1日量:2錠中) ペミロラストカリウム 10mg
3	用法・用量	成人(15才以上)1回1錠を1日2回、朝食後及び夕食後に服用してください。 <用法・用量に関連する注意> (1) 花粉によるアレルギー症状に対して服用する場合は、花粉飛散開始の1~2週間前を目安に服用を開始することが望ましい。 (2) 本剤は効果があらわれるまでに1~2週間必要とすることがあります。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分に対してアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 (4)15才未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他のアレルギー用薬(鼻炎用内服薬、皮膚疾患用薬を含む) 3. 服用時は飲酒しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・アレルギーによる症状か、他の原因による症状かはっきりしない人。 ・抗ヒスタミン薬を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬)を服用している人。 ・次の診断を受けた人。気管支ぜんそく
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。