

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	タナベ胃腸薬<調律>
2	成分・分量	成分(6錠中) トリメブチンマレイン酸塩(TM) 300mg、ビオチアスターゼ2000 120mg、 リパーゼAP6 45mg、カンゾウ末 150mg、ロートエキス 30mg、 炭酸水素ナトリウム 300mg、沈降炭酸カルシウム 600mg、 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物換算) 240mg
3	用法・用量	成人(15才以上)1回2錠を1日3回毎食後約 30 分以内に、水またはお湯でかまずに服用してください。
4	効能・効果	◎胃もたれ、胃部膨満感、胃重 ◎はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、胃部不快感 ◎食べすぎ、飲みすぎ、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感 ◎食欲不振、胃弱、消化不良、胸つかえ ◎胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ、嘔吐
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 透析療法を受けている人。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。) 4. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 排尿困難 ・次の診断を受けた人。 腎臓病、肝臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。