

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	セレキノンS
2	成分・分量	成分(1日量:3錠中) トリメブチンマレイン酸塩 300mg
3	用法・用量	成人(15才以上)1回1錠を1日3回、食前又は食後に水又はお湯でかまずに服用してください。
4	効能・効果	過敏性腸症候群の次の諸症状の緩和:腹痛又は腹部不快感を伴い、繰り返し又は交互にあらわれる下痢及び便秘(以前に医師の診断・治療を受けた人に限ります。)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 (1) 医師から過敏性腸症候群の診断・治療を受けたことがない人。 (2) 過敏性腸症候群の再発かどうかよくわからない人(例えば、今回の症状は、以前に過敏性腸症候群の診断・治療を受けた時と違う)。 (3) 就寝中などの夜間にも、排便のためにトイレに行きたくなったり、腹痛がある人。 (4) 発熱がある人。 (5) 関節痛がある人。 (6) 粘血便(下血)がある人。 (7) 繰り返すひどい下痢がある人。 (8) 急性の激しい下痢がある人。 (9) 排便によってよくなる腹ない腹痛がある人。 (10) 嘔吐がある人。 (11) 6ヵ月以内に、体重が3kg以上、予期せず減少した人。 (12) 大腸がん、炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎等)の既往がある人。 (13) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (14) 15才未満の小児。 2. 長期連用しないでください。 3. 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。・50才以上の人。・貧血がある人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の診断を受けた人。肝臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、副甲状腺機能亢進症 ・大腸がん、炎症性腸疾患の家族がいる人。・腹痛、便秘がひどい人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。