


アスパラドリンクα

 使用上の注意	解 説
<div data-bbox="161 293 188 331" style="float: left; margin-right: 5px;"></div> <div data-bbox="197 293 477 331" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">相談すること</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。 医師の治療を受けている人（腎臓疾患で電解質の摂取制限を受けている人など）。 2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。 <ol style="list-style-type: none"> 1) 発疹、悪心・嘔吐、軟便・下痢などの症状が現れた場合 2) しばらく服用しても症状の改善がみられない場合 <p>〈用法・用量に関連する注意〉</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 用法・用量を厳守してください（他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には、過剰摂取等に注意すること）。 <p>〈成分に関連する注意〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 鉄分の味・臭いを感じることがありますが、クエン酸鉄アンモニウムの配合によるものであり、心配ありません。 ● 本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色くなることがあります。 	<p>医師の治療を受けている人は、医師から何らかの薬剤の投与又は処置を受けており、自己判断で他の薬剤を服用することは、同種薬剤の重複投与や相互作用などを引き起こすおそれがありますので、医師に相談するようお勧めください。</p> <p>（特に腎臓疾患で治療を受けている人は、腎臓機能が低下している可能性があり、電解質の排泄低下によって、高カリウム血症又は高マグネシウム血症を呈するおそれがあります。）</p> <p>本剤の服用により、発疹、悪心・嘔吐、軟便・下痢などの症状があらわれることがあります。その程度は人により一様ではありませんが、症状があらわれた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けるようお勧めください。</p> <p>効果のあらわれ方は、症状や服用される人の体質などによって異なりますが、しばらく服用しても症状の改善が見られない場合は、他の原因も考えられますので、服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けるようお勧めください。</p> <p>医薬品にはそれぞれ有効な用法・用量が決められています。それを下回った場合には効果が得られないこともあり、また、定められた用量以上大量に服用しても、効果はそれに比較して上がるわけではなく、場合によっては副作用があらわれるおそれもあります。薬は定められた用法・用量を正しく守ることが大切です。</p> <p>ビタミンB₂は水溶性で、水に溶かすと黄色液になります。従って、服用後に排泄される尿が黄色を帯びていることがありますが、これはビタミンB₂が尿中に溶け込んでいるためです。</p>
<div data-bbox="161 1727 520 1765" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保管及び取扱い上の注意</div> <ol style="list-style-type: none"> (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。 	<p>各々の製品により定められた保管条件を守らないと品質の劣化や期待する効果が得られない等の悪影響を及ぼすおそれがあります。</p> <p>小児の誤飲・誤用を防止するために注意喚起しています。</p> <p>使用期限とは、最終包装の形態で流通下における通常の保存条件（室温）下で保管された場合に、その性状や品質を保証できる期限です。 各製品毎に実施される安定性試験（原則として、最終包装製品を室温で保存）のデータに基づいて設定されています。</p>