

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



胃もたれ・むかつきに

タナベ胃腸薬〈調律〉

第2類
医薬品

「もたれる」「胃が重い」「ムカムカする」などの不快な症状は、“胃腸運動”の低下等が原因で引き起こされているのです。タナベ胃腸薬

〈調律〉は、当社が開発した“胃腸運動”調律剤TM(トリメブチンマレイン酸塩)を配合した胃腸薬。弱った胃腸をイキイキ動かす外からのTM効果と、内からの効果(消化・制酸・粘膜修復)により、不快な症状を改善。外と内から効いて、スッキリさせる胃腸薬です。

■こんな方によく効きます。



もたれ



むかつき



膨満感



胸やけ



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 腎臓病、肝臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|---------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 精神神経系 | 眠気、めまい、倦怠感、頭痛 |
| その他 | 動悸、口内しびれ感、腹鳴 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|---|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能

- ◎胃もたれ、胃部膨満感、胃重
- ◎はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、胃部不快感
- ◎食べすぎ、飲みすぎ、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感
- ◎食欲不振、胃弱、消化不良、胸つかえ
- ◎胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ、嘔吐

用法・用量

次の量を食後約30分以内に、水またはお湯でかまずに服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15才以上) | 2錠 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方

○「シート包装」の場合は、右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってシートごとのみ込んだりすると、シートが食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる場合があります。)



○「ビン包装」は上記の操作は必要ありません。

成分(6錠中)

| 成分 | 含量 | はたらき | |
|--------|-------------------------|--------------|-------------|
| 上層 | トリメブチンマレイン酸塩(TM) | 300mg | 胃腸運動を整える |
| 中層 | ビオチン | 120mg | 消化を助ける |
| | リパーゼAP6 | 45mg | 消化を助ける |
| | カンゾウ末 | 150mg | 粘膜を修復し、保護する |
| ロートエキス | 30mg | 過剰な胃酸の分泌を抑える | |
| 下層 | 炭酸水素ナトリウム | 300mg | 胃酸を中和する |
| | 沈降炭酸カルシウム | 600mg | 胃酸を中和する |
| | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物換算) | 240mg | 胃酸を中和する |

添加物：D-マンニトール、ポビドン、カルメロース、ステアリン酸Mg、ℓ-メントール、乳糖、エチルセルロース、セルロース、二酸化ケイ素

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビン包装の製品は服用のつどフタをよくしめてください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10

ホームページ www.mt-pharma.co.jp

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
(独)医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)