



ナンパオ源気

 使用上の注意	解 説
<div data-bbox="161 293 188 331" style="float: left; margin-right: 5px;"></div> <div data-bbox="199 293 477 331" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">相談すること</div> <p>1. 服用後、発疹等の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>〈用法・用量に関連する注意〉 用法・用量を厳守してください。</p> <p>〈成分に関連する注意〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 本剤の服用後、尿が黄色を帯びることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので心配ありません。 ○ 本剤は生薬成分を配合していますので、まれに沈殿を生じることがありますが、服用に支障はありません。よく振ってから服用してください。 <div data-bbox="161 1357 520 1395" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">保管及び取扱い上の注意</div> <p>(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)</p> <p>(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p>	<p>本剤の服用により、発疹などの症状があらわれる場合があります。その程度は人により一様ではありませんが、症状があらわれた場合には、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師の診療を受けるようお勧めください。</p> <p>効果のあらわれ方は、症状や服用される人の体質などにより異なりますが、しばらく服用しても症状の改善が見られない場合は、他の原因も考えられますので、服用を中止し、このパッケージを持って医師の診療を受けるようお勧めください。</p> <p>医薬品にはそれぞれ有効な用法・用量が決められています。それを下回った場合には効果が得られないこともあり、また、定められた用量以上大量に服用しても、効果はそれに比較して上がるわけではなく、場合によっては副作用があらわれるおそれもあります。薬は定められた用法・用量を正しく守ることが大切です。</p> <p>ビタミンB₂は水溶性で、水に溶かすと黄色液になります。従って、服用後に排泄される尿が黄色を帯びていますが、これはビタミンB₂が尿中に溶け込んでいるためです。</p> <p>濁りや沈殿が生じるのは、溶液中に溶解しきれなかった生薬成分の析出によるもので、品質や効果には影響ありません。</p> <p>各々の製品により定められた保管条件を守らないと品質の劣化や期待する効果が得られない等の悪影響を及ぼすおそれがあります。</p> <p>小児の誤飲・誤用を防止するために注意喚起しています。</p> <p>他の容器に入れ替えると、入れ替えた薬剤が何であったか分からなくなったり、湿気、汚れ、光などにより薬剤の品質が保持できなくなるおそれがあります。</p> <p>使用期限とは、最終包装の形態で流通下における通常の保存条件(室温)下で保管された場合に、その性状や品質を保証できる期限です。各製品毎に実施される安定性試験(原則として、最終包装製品を室温で保存)のデータに基づいて設定されています。</p>