





タナベ胃腸薬ウルソ

 使用上の注意	解 説						
<p> 相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。</p> <p>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <table border="1" data-bbox="201 1176 705 1276"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> <tr> <td>消化器</td> <td>下痢、吐き気</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>〈用法・用量に関連する注意〉</p> <p>(1) 用法・用量を厳守してください。</p> <p>(2) 錠剤の取り出し方 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、1錠取り出して服用してください。(誤ってそのまま服用すると、粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる場合があります。)</p> <div data-bbox="454 1982 678 2139" style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">押す</p> </div>	関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	下痢、吐き気	<p>医師の治療を受けている人は、医師から何らかの薬剤の投与又は処置を受けており、自己判断で他の薬剤を服用することは、同種薬剤の重複投与や相互作用などを引き起こすおそれがありますので、医師に相談するようお勧めください。</p> <p>妊娠時に服用した薬剤は血液中に移り、胎盤を通過して胎児に悪影響を与えるおそれがありますので、妊婦は安易に薬剤を服用するのではなく、慎重を期す必要があります。一般に妊婦は定期的に医師の診療を受けていますので、薬剤の服用に際しては医師に相談するようお勧めください。</p> <p>人によっては配合成分や添加物でアレルギー症状を起こすおそれがあります。過去に薬や食品、化粧品等によるアレルギー症状の既往歴のある人は、薬物アレルギーを起こしやすいので注意が必要です。</p> <p>配合されている成分により、あらわれることが予測される副作用症状を記載しています。これらの症状があらわれた場合には、直ちに服用を中止し、本剤の添付文書を持って医師の診療を受けるようお勧めください。</p> <p>2週間位服用しても症状の改善が見られない場合には、他の原因も考えられますので、服用を中止し、本剤の添付文書を持って医師の診療を受けるようお勧めください。</p> <p>医薬品にはそれぞれ有効な用法・用量が決められています。それを下回った場合には効果が得られないこともあり、また、定められた用量以上大量に服用しても、効果はそれに比較して上がるわけではなく、場合によっては副作用があらわれるおそれもあります。 薬は定められた用法・用量を正しく守ることが大切です。</p> <p>PTP包装から薬剤を取り出さずにそのまま飲み込んでしまい、食道粘膜に突き刺さってしまうなどの重大な誤飲事故が報告されています。このような誤飲を防ぐ目的で、注意喚起しています。</p>
関係部位	症状						
皮膚	発疹・発赤、かゆみ						
消化器	下痢、吐き気						

 使用上の注意	解 説
<p data-bbox="165 297 520 331">保管及び取扱い上の注意</p> <p data-bbox="165 340 715 405">(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p data-bbox="165 465 715 530">(2) 小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p data-bbox="165 548 715 647">(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)</p> <p data-bbox="165 674 715 739">(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p>	<p data-bbox="724 340 1453 439">各々の製品により定められた保管条件を守らないと品質の劣化や期待する効果が得られない等の悪影響を及ぼすおそれがあります。</p> <p data-bbox="724 465 1437 499">小児の誤飲・誤用を防止するために注意喚起しています。</p> <p data-bbox="724 548 1465 647">他の容器に入れ替えると、入れ替えた薬剤が何であったか分からなくなったり、湿気、汚れ、光などにより薬剤の品質が保持できなくなるおそれがあります。</p> <p data-bbox="724 674 1465 835">使用期限とは、最終包装の形態で流通下における通常の保存条件(室温)下で保管された場合に、その性状や品質を保証できる期限です。 各製品毎に実施される安定性試験(原則として、最終包装製品を室温で保存)のデータに基づいて設定されています。</p>